

# ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA

## ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA KOPOP



2018

## KAZALO VSEBINE

|  |    |
|--|----|
| 1 UVOD.....  | 3  |
| 2 KARANTENSKI ŠKODLJIVI ORGANIZMI NA TRTI .....  | 3  |
| 3 UKREPI ZA OBVLADOVANJE ZLATE TRSNE RUMENICE.....   | 3  |
| 4 ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA .....  | 3  |
| 5 PODROBNEJŠI PODATKI O FITOFARMACEVTSKIH SREDSTVIH ZA ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA .....   | 6  |
| 5.1 Actara 25 WG .....   | 7  |
| 5.2 Reldan 22 EC .....   | 7  |
| 5.3 Decis 2,5 EC, Decis, Gat decline 2,5 EC .....  | 7  |
| 5.4 Pripravki na osnovi piretrina .....  | 8  |
| 5.5 Steward.....   | 8  |
| 5.6 Pyrinex M 22.....  | 8  |
| Preglednica 1: Pregled pripravkov, ki jih je možno uporabljati za zatiranje ameriškega škržatka (stanje na dan 30. 5. 2018).....   | 4  |
| Preglednica 2: Okvirni termini tretiranja ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo grozdja na razmejenem območju in ustrezna fitofarmacevtska sredstva (stanje na dan 1. 6. 2017) .....                     | 5  |
| Preglednica 3: Okvirni termini tretiranja ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo grozdja v ekološki pridelavi na razmejenem območju in ustrezna fitofarmacevtska sredstva (stanje na dan 1. 6. 2017)..... | 6  |
| Preglednica 4: Okvirni termini tretiranja ameriškega škržatka v matičnih vinogradih (stanje na dan 1. 6. 2017) .....   | 6  |
| Priloga 1: Karta razmejenih območij zlate trsne rumenice z žarišči okužbe in varovalnimi pasovi ter seznam občin v razmejenih območjih .....   | 9  |
| Priloga 2: Institucije, v katerih deluje Javna služba zdravstvenega varstva rastlin .....  | 10 |

Fotografija na naslovnici: mag. Erika Orešek, mag. Gabrijel Seljak

## 1 UVOD

V skladu z [Uredbo](#) o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, z vsemi spremembami; v nadaljevanju: uredba) se v okviru operacije Vinogradništvo izvaja tudi izbirna zahteva »VIN\_INSK: Opustitev uporabe insekticidov« (v nadaljevanju: zahteva VIN\_INSK). Pri izvajanju te zahteve je uporaba insekticidov v vinogradih prepovedana, razen za obvladovanje karantenskih škodljivih organizmov.

V nadaljevanju je opisano zatiranje ameriškega škržatka (*Scaphoideus titanus*), prenašalca fitoplazme, povzročiteljice zlate trsne rumenice (fitoplazma *Grapevine flavescence dorée*). Opis je pripravila Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Sektor za zdravje rastlin in rastlinski semenski material.

## 2 KARANTENSKI ŠKODLJIVI ORGANIZMI NA TRTI

Na trti (*Vitis*) se v Republiki Sloveniji pojavljata dva karantenska škodljiva organizma, in sicer:

- fitoplazma *Grapevine flavescence dorée*, povzročiteljica zlate trsne rumenice, ki jo prenaša ameriški škržatek (*Scaphoideus titanus* Ball);
- trtna uš (*Viteus vitifoliae* Fitch), ki povzroča škodo v matičnjakih podlag in za zahtevo VIN\_INSK z vidika zatiranja karantenskih škodljivih organizmov ni relevantna, ker se zatiranje ne izvaja v vinogradih za pridelavo grozdja.

## 3 UKREPI ZA OBVLADOVANJE ZLATE TRSNE RUMENICE

Ukrepe za obvladovanje zlate trsne rumenice določa [Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice](#) (Uradni list RS, št. 48/14, z vsemi spremembami; v nadaljevanju: pravilnik). Ta pravilnik med drugim določa, da morajo vsi imetniki trte, torej tudi imetniki vinogradov za pridelavo grozdja, na razmejenem območju zlate trsne rumenice obvezno zatirati ameriškega škržatka, ki je prenašalec fitoplazme *Grapevine flavescence dorée*. Če so vinogradi za pridelavo grozdja obenem tudi matični vinogradi, je v takih vinogradih zatiranje ameriškega škržatka obvezno povsod po Sloveniji, torej tudi izven razmejenih območij. Obvezno zatiranje velja tudi v ekološki pridelavi.

V pravilniku je tudi določeno, da je zatiranje podrobneje opredeljeno z [Načrtom ukrepov obvladovanja zlate trsne rumenice](#) (v nadaljevanju: načrt ukrepov), natančnejše roke pa vsako leto določi [Javna služba zdravstvenega varstva rastlin](#).

V skladu s pravilnikom Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju: uprava) z odločbo določi razmejeno območje zlate trsne rumenice. Razmejeno območje obsega žarišča okužbe zlate trsne rumenice in pripadajoče varovalne pasove. V preteklih letih je bilo zaradi številnih najdb zlate trsne rumenice v vseh vinorodnih deželah razmejeno območje določeno tako, da obsega večino območij z vinogradi na Primorskem, Dolenjskem, v Beli Krajini, Posavju, na Štajerskem in v Prekmurju. Določeno je z mejami občin, vključuje pa vse tri vinorodne dežele v Sloveniji. V primeru laboratorijsko potrjene nove najdbe zlate trsne rumenice uprava določi novo žarišče okužbe in po potrebi poveča tudi varovalni pas. Karta razmejenih območij in seznam občin v razmejenem območju zlate trsne rumenice, nazadnje določenih z odločbo uprave z dne 5. 7. 2018, je v prilogi 1 ([Priloga 1](#)). Institucije po območjih, kjer deluje Javna služba zdravstvenega varstva rastlin, in kontaktni podatki so v prilogi 2 ([Priloga 2](#)).

Več informacij o zlati trsni rumenici in o ukrepanju je na spletni strani [uprave](#).

## 4 ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA

Na podlagi opazovanja razvoja ameriškega škržatka in prognostičnega modela [Javna služba zdravstvenega varstva rastlin](#) vsako leto pripravi natančnejšo napoved rokov za zatiranje ameriškega škržatka za posamezna območja in jih objavi na spletnih straneh [Agrometeorološkega portala Slovenije](#), [Instituta za](#)

[hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije](#), Kmetijsko gozdarskih zavodov [Nova Gorica](#), [Maribor](#) in [Novo mesto](#) ter [Kmetijskega inštituta Slovenije](#). Imetniki trte na razmejenem območju so dolžni te napovedi upoštevati. Nadzor zatiranja opravljajo fitosanitarni inšpektorji [Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin](#). Če zatiranje ni izvedeno v skladu z načrtom ukrepov oziroma z napovedjo Javne službe zdravstvenega varstva rastlin, fitosanitarni inšpektorji ukrepajo v skladu z [Zakonom o prekrških](#) (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13 in 111/13).

Navodila za zatiranje ameriškega škržatka za leto 2018 so objavljena na spletni strani [uprave](#).

Sredstva in okvirni roki ter navodila za zatiranje ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo grozdja znotraj izjemne uporabe insekticidov v okviru zahteve VIN\_INSK so v skladu z [načrtom ukrepov](#).

### POZOR!

Ponudba in registracijski status dovoljenih pripravkov se lahko spremenita, zato je zaradi ažurnosti podatkov o fitofarmaceutskih sredstvih in navodil o tehnologiji zatiranja treba redno spremljati objave na spletnih straneh [uprave](#) oziroma na [Agrometeorološkem portalu Slovenije](#).

**Sredstva je treba uporabljati v skladu z navodili za uporabo in navedbami na etiketi.**

Pregled pripravkov, ki imajo dovoljenje za zatiranje ameriškega škržatka, je prikazan v preglednici 1. Okvirni roki in sredstva za vinograde za pridelavo grozdja so za različne primere navedeni v preglednicah 2, 3 in 4.

*Preglednica 1: Pregled pripravkov, ki jih je možno uporabljati za zatiranje ameriškega škržatka (stanje na dan 30. 5. 2018)*

| Pripravek                 | Aktivna snov      | Odmerek             | Število dovoljenih uporab letno <sup>1</sup> | Veljavnost registracije  |
|---------------------------|-------------------|---------------------|--|--|
| Actara 25 WG              | tiametoksam       | 0,2 kg/ha           | 3  | 30. 4. 2019  |
| Decis                     | deltametrin       | 0,5 l/ha            | 1  | 31. 1. 2018, lahko se uporablja za zatiranje ameriškega škržatka v letu 2018 |
| Decis 2,5 EC              | deltametrin       | 0,5 l/ha            | 1  |  |
| Gat decline 2,5 EC        | deltametrin       | 0,5 l/ha            | 2  | 25. 4. 2017 <sup>3</sup>   |
| Reldan 22 EC              | klorpirifos-metil | 1 l/ha <sup>2</sup> | 1  | 31. 1. 2019  |
| Steward <sup>2</sup>      | indoksakarb       | 150 g/ha            | 2  | 31. 10. 2018   |
| Pyrinex M 22 <sup>2</sup> | klorpirifos-metil | 1 l/ha              | 1  | 31. 1. 2019  |
| Flora verde               | piretrin          | 1,6 l/ha            | 3  | 31. 8. 2020  |
| Biotip floral             | piretrin          | 1,6 l/ha            | 3  | 31. 8. 2020  |

<sup>1</sup> Število dovoljenih uporab po GAP iz registracije fitofarmaceutskih sredstev (glej FITO-INFO <http://www.fito-info.si/>).

<sup>2</sup> Pripravki Reldan 22 EC v odmerku 1 l/ha, Steward in Pyrinex M 22 so primerni le za omejevanje ameriškega škržatka in **ne** za obvezno zatiranje v razmejenih območjih zlate trsne rumenice.

<sup>3</sup> Gat decline 2,5 EC je dovoljeno uporabljati do 25. 10. 2018.

### POZOR!

Za zatiranje ameriškega škržatka je treba uporabljati sredstva, navedena v preglednicah 2, 3 in 4 v tem poglavju. Števila obveznih tretiranj za običajno pridelavo, ekološko pridelavo in matične vinograde, ki so tudi vinogradi za pridelavo grozdja, so navedena v nadaljevanju. Pri številu tretiranj se je treba držati navodil iz tega poglavja, pri rokih tretiranja pa upoštevati napovedi [Javne službe zdravstvenega varstva rastlin](#).

V vinogradih za pridelavo grozdja, ki se nahajajo v razmejenem območju (to so žarišča okužbe in varovalni pasovi), je obvezno **najmanj eno tretiranje**. Tretiranje se opravi, **ko je trta povsem odcvetela**, pri tem ima prednost pripravek Actara 25 WG (aktivna snov je tiametoksam). Pripravek Actara 25 WG je sistemski insekticid z rezidualnim načinom delovanja, ki učinkovito zatira ameriškega škrdatka, zato tretiranja običajno ni treba ponoviti. Če je bilo za prvo tretiranje uporabljeno katero drugo izmed naštetih sredstev v preglednici 2, je treba tretiranje ponoviti v drugem napovedanem roku. Delovanje ostalih sredstev je namreč krajše in so manj učinkovita (samo teden do deset dni). V tem primeru se za drugo tretiranje proti amerškemu škrdatku uporabi eno izmed sredstev, ki je navedeno (za drugo tretiranje) v preglednici 2. Pri tem je smiselno spremljati ulov odraslih amerških škrdatkov z rumenimi lepljivimi ploščami. Drugo tretiranje se opravi, če je na rumene lepljive plošče ulovljenih štiri ali več škrdatkov na ploščo na teden.

Ulov odraslih amerških škrdatkov se spremlja z rumenimi lepljivimi ploščami od julija dalje, in sicer se izobesi najmanj od tri do pet plošč na ha, v primeru večjih površin se število plošč ustrezno poveča. Za učinkovito spremljanje se plošče pregleduje vsakih sedem do deset dni in jih menjava na dva do tri tedne. Ulov se redno beleži. Amerški škrdatki letajo do sredine septembra.

Okvirni termini in pripravki so navedeni v preglednicah 2 (običajna pridelava), 3 (ekološka pridelava) in 4 (kadar gre za matični vinograd, ki je tudi vinograd za pridelavo grozdja), natančnejše roke pa napove [Javna služba zdravstvenega varstva rastlin](#).

*Preglednica 2: Okvirni termini tretiranja amerškega škrdatka v vinogradih za pridelavo grozdja na razmejenem območju in ustrezna fitofarmacevtska sredstva (stanje na dan 1. 6. 2017)*

| Tretiranje / termin tretiranja   | Razvojna faza trte           | Razvojni stadij amerškega škrdatka   | Sredstvo  | Opombe  |
|--|------------------------------|--|---|---|
| Prvo tretiranje sredina junija do konca junija                                 | Po končanem cvetenju BBCH 69 | Ličinke L <sub>1</sub> do L <sub>3</sub> (dva do štiri tedne po začetku izleganja) | <b>Actara 25 WG</b><br>Decis 2,5 EC<br>Decis<br>Gat decline 2,5 EC<br>Pripravki na osnovi piretrina (Flora verde, Biotip floral)<br>Reldan 22 EC*<br>Pyrinex M22* | Prednost ima pripravek Actara 25 WG.<br>*Z Reldanom 22 EC ali Pyrinexom M22 se lahko v eni rastni dobi tretira le enkrat, ker imata obe sredstvi isto aktivno snov – klorpirifos-metil.   |
| Drugo tretiranje običajno dva do tri tedne po prvem tretiranju (do 15. julija) | BBCH od 71 dalje             | Ličinke L <sub>2</sub> do L <sub>5</sub> , prvi odrasli škrdatki                   | Actara 25 WG<br>Reldan 22 EC<br>Pyrinex M22   | Če se je za prvo tretiranje uporabil pripravek Actara 25 WG, drugo tretiranje ni potrebno.<br><br>Drugo tretiranje se opravi le v primeru, če se je za prvo tretiranje uporabil drug insekticid oziroma je na rumene lepljive plošče ulovljenih štiri ali več osebkov na ploščo na teden. |

**V ekološki pridelavi je treba prvo tretiranje opraviti takrat, ko trta povsem odcveti.** S pripravki na osnovi piretrina je treba opraviti najmanj dve tretiranji, razen če se po prvem tretiranju s spremljanjem ulova z rumenimi lepljivimi ploščami ugotovi, da ulov odraslih škrdatkov ne presega štiri osebkov na rumeno lepljivo ploščo na teden. V takem primeru tretiranja ni treba ponoviti (spremljanje ulova amerškega škrdatka je opisano zgoraj). Če je treba, se opravi drugo tretiranje sedem do deset dni po prvem tretiranju v skladu z napovedjo [Javne služba zdravstvenega varstva rastlin](#). Okvirni termini in pripravki so v navedeni preglednici 3.

Preglednica 3: Okvirni termini tretiranja ameriškega škrdatka v vinogradih za pridelavo grozdja v ekološki pridelavi na razmejenem območju in ustrezna fitofarmaceutvska sredstva (stanje na dan 1. 6. 2017)

| Tretiranje / termin tretiranja                        | Razvojna faza trte           | Razvojni stadij ameriškega škrdatka  | Sredstvo   | Opombe  |
|---|------------------------------|--|--|---|
| Prvo tretiranje sredina junija do konca junija        | Po končanem cvetenju BBCH 69 | Ličinke L <sub>1</sub> do L <sub>3</sub> (dva do štiri tedne po začetku izleganja) | Pripravki na osnovi piretrina (Flora verde, Biotip floral) |   |
| Drugo tretiranje pet do sedem dni po prvem tretiranju | BBCH od 71 dalje             | Ličinke L <sub>2</sub> do L <sub>5</sub> , prvi odrasli škrdatki                   | Pripravki na osnovi piretrina (Flora verde, Biotip floral) | Drugo tretiranje se opravi le v primeru, če je na rumene lepljive plošče ulovljenih štiri ali več osebkov na ploščo na teden. |

Kadar se vinogradi za pridelavo grozdja uporabljajo kot matični vinogradi, sta obvezni najmanj dve tretiranji ameriškega škrdatka. Tretje tretiranje je treba opraviti, če so na rumene lepljive plošče ulovljeni odrasli škrdatki. Okvirni termini in dovoljena sredstva so navedeni v preglednici 4.

Preglednica 4: Okvirni termini tretiranja ameriškega škrdatka v matičnih vinogradih (stanje na dan 1. 6. 2017)

| Tretiranje / termin tretiranja   | Razvojna faza trte           | Razvojni stadij ameriškega škrdatka  | Sredstvo  | Opombe  |
|--|------------------------------|--|---|---|
| Prvo tretiranje: sredina junija do konca junija                              | Po končanem cvetenju BBCH 69 | Ličinke L <sub>1</sub> do L <sub>3</sub> (dva do štiri tedne po začetku izleganja) | Actara 25 WG<br>Decis 2,5 EC<br>Reldan 22 EC*<br>Pyrinex M22*<br>Pripravki na osnovi piretrina (Flora verde, Biotip floral)                       | Za prvo tretiranje ima prednost pripravke Actara 25 WG.<br>* Z Reldanom 22 EC ali Pyrinexom M22 se lahko v eni rastni dobi tretira le enkrat, ker imata obe sredstvi isto aktivno snov – klorpirifos-metil. |
| Drugo tretiranje: okoli dva do tri tedne po prvem tretiranju (do 15. julija) | BBCH od 71 dalje             | Ličinke L <sub>2</sub> do L <sub>5</sub> , prvi odrasli škrdatki                   | Actara 25 WG<br>Actara 25 WG<br>Decis 2,5 EC**<br>Reldan 22 EC**<br>Pyrinex M22**<br>Pripravki na osnovi piretrina (Flora verde, Biotip floral)** | **V tem terminu se s temi sredstvi zajame tudi grozdne sukače. Pripravek Decis 2,5 EC se lahko uporabi dvakrat v rastni dobi.   |
| Tretje tretiranje konec julija, prva dekada avgusta                          | BBCH od 81 dalje             | Odrasli škrdatki   | Actara 25 WG<br>Decis 2,5 EC<br>Pripravki na osnovi piretrina (Flora verde, Biotip floral)  | Tretje tretiranje se opravi, če so na rumene lepljive plošče ulovljeni odrasli škrdatki.  |

## 5 PODROBNEJŠI PODATKI O FITOFARMACEVTSKIH SREDSTVIH ZA ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRDATKA

V nadaljevanju so navedeni pogoji uporabe in opozorila glede uporabe posameznih sredstev iz navodil za uporabo.



Za zatiranje ameriškega škržatka je treba uporabljati sredstva, navedena v poglavju 4, pri številu tretiranj se je prav tako treba držati navodil iz poglavja 4, pri rokih tretiranja pa upoštevati napovedi [Javne službe zdravstvenega varstva rastlin](#).

**POZOR: Vsa navedena sredstva so nevarna za čebele. Pomembno je, da se tretiranje opravi šele takrat, ko trta povsem odcveti.**

### 5.1 Actara 25 WG

Pripravek Actara 25 WG učinkovito zatira vse razvojne stadije ameriškega škržatka. Najbolj je učinkovit, če se uporabi v zgodnjih stadijih ličinke (L<sub>1</sub> do L<sub>3</sub>). Uporablja se ga v odmerku 200 g/ha. **Dovoljena so največ tri tretiranja** na istem zemljišču v eni rastni dobi, sredstvo se uporablja v presledkih 21 dni. Kot manjša uporaba je sredstvo dovoljeno za zatiranje ameriškega škržatka v trsnicah in matičnjakih, in sicer največ tri tretiranja v eni rastni dobi v presledkih 21 dni. **Sredstvo Actara 25 WG je prepovedano uporabljati pred ali med cvetenjem trte.** Uporablja se ga lahko le takrat, ko ni vetra.

Pri tretiranju vinske trte je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da se tretira v oddaljenosti najmanj 20 m od njih. Sredstvo Actara 25 WG spada med sistemična sredstva in je razvrščeno kot nevarno za čebele, zato ga je treba uporabiti **po končanem cvetenju trte.** Pred tretiranjem je treba odstraniti vso cvetočo podrast v vinogradu in njegovi neposredni bližini. Pri uporabi pripravka Actara 25 WG je treba paziti, da rastlina ni v stresu, v tem primeru je namreč delovanje tega sredstva slabše.

**POZOR: Pripravek ima dovoljenje za zatiranje ameriškega škržatka le do 31. 4. 2019.**

### 5.2 Reldan 22 EC

Pripravek Reldan 22 EC v odmerku 1 l/ha **se uporablja za omejevanje številčnosti** ameriškega škržatka in za karantenski ukrep v razmejenih območjih ne zadošča. Uporablja se v 0,1 % koncentraciji ob porabi vode 1.000 l/ha oziroma 10 ml na 10 l vode na 100 m<sup>2</sup>.

Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi samo enkrat v eni rastni dobi v skladu z napovedjo [Javne službe zdravstvenega varstva rastlin](#) za zatiranje grozdnih sukačev. Če je uporabljeno v skladu z navodili, ni fitotoksično na gojenih rastlinah. Pri sortah vinske trte Zeleni sauvignon in Merlot lahko povzroča delno razbarvanje listov.

Sredstvo je nevarno za čebele. Zaradi zaščite žuželk in drugih žuželk opráševalcev se rastlin ne tretira med cvetenjem in v prisotnosti cvetočega plevela. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 50 m do vodne površine. Ne tretira se v vročem in vetrovnem vremenu.

**POZOR: Opozorilo: s pripravki na podlagi klorpirifos-metila lahko tretiramo le 1 krat v rastni dobi, kar pomeni, da lahko 1 krat uporabimo Reldan 22 EC ali Pynrex M22 ali Daskor 440.**

### 5.3 Decis 2,5 EC, Decis, Gat decline 2,5 EC

- Decis 2,5 EC in Decis

Dovoljeno je eno tretiranje za vinograde za pridelavo grozdja, in sicer od konca cvetenja trte do takrat, ko jagode dosežejo velikost graha (BBCH 71 do 75). Uporablja se ga v odmerku 0,5 l/ha. Mešanje z alkalnimi pripravki, s pripravki na podlagi žvepla in tiofanata ni priporočeno.

Dve tretiranjii sta dovoljeni za matične vinograde, matičnjake in trsnice.

- Gat decline

Dovoljeni sta dve tretiranji v odmerku 0,5 l/ha.

Skupno število tretiranj z vsemi tremi sredstvi je največ dvakrat na istem zemljišču v eni rastni dobi.

Pri uporabi pripravkov Decis, Decis 2,5 EC in Gat decline 2,5 EC je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da se upoštevajo predpisi s področja varstva voda. S sredstvi se ne sme tretirati v območju 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. Sredstva so nevarna za čebele, z njimi se ne sme tretirati v času cvetenja gojenih rastlin in podrasti. **Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opravevalcev se lahko tretira v nočnem času dve uri po sončnem zahodu in največ dve uri pred sončnim vzhodom.**

Pripravki Decis 2,5 EC, Decis in Gat decline 2,5 EC spadajo v skupino sintetičnih piretroidov. Imajo negativen vpliv na plenilske pršice iz družine *Phytoseiidae* – naravne sovražnike rdeče sadne pršice in pršic šiškarič (akarinoze in erinoze). Zato v takšnih vinogradih lahko pride do prerazmnožitve omenjenih škodljivcev.

#### 5.4 Pripravki na osnovi piretrina

Pripravki na osnovi piretrina, ki imajo dovoljenje za zatiranje ameriškega škržatka, sta Flora verde in Biotip floral. Na podlagi preverjanja pristojnih služb na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano uporaba piperonil butoksida, ki ga vsebujejo ti pripravki, v ekološki pridelavi ni sporna, zato se lahko uporabljajo vsa naštetna sredstva na podlagi aktivne snovi piretrin.

Učinek teh sredstev je boljši z dodatkom ogrščičnega olja v koncentraciji 0,5 %. Rastline se temeljito omoči tudi na spodnji strani listov. Tretira se ob lepem vremenu, po možnosti zvečer oziroma v hladnejših urah dneva. **Sredstva so nevarna za čebele.**

Pripravka **Flora verde** in **Biotip floral** se uporabita v 0,16 % koncentraciji oziroma v odmerku 1,6 l/ha. Sredstvi sta primerni za omejevanje ameriškega škržatka. V primeru močnega napada se tretiranje ponovi po sedmih do petnajstih dneh. Oba pripravka imata dovoljenje tudi za zatiranje križastega in pasastega grozdnega sukača. Priporoča se uporaba zvečer in v hladnejših urah dneva. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda **Sredstvi sta nevarni za čebele.**

#### 5.5 Steward

Uporaba pripravka Steward je dovoljena le za ličinke stadijev od L<sub>1</sub> do L<sub>3</sub>, vendar sredstvo le zmanjšuje populacijo ameriškega škržatka in za karantenski ukrep v razmejenih območjih ne zadošča. Uporablja se ga v koncentraciji 0,015 % pri porabi vode 1.000 l/ha. **Sredstvo je nevarno za čebele.** Uporablja se ga lahko v oddaljenosti več kot 15 m od nadzemnih voda 1. reda in 5 m od nadzemnih voda 2. reda. Ne sme se ga uporabljati v času cvetenja.


#### 5.6 Pynex M 22

Pripravek Pynex M 22 se lahko uporablja v odmerku 1 l/ha kot insekticid za omejevanje številčnosti ameriškega škržatka in ne zadošča za karantenski ukrep v razmejenih območjih zlate trsne rumenice. V tem odmerku se lahko uporablja izven razmejenih območij. Glede uporabe velja enako kot pri pripravku Reldan 22 EC v odmerku 1 l/ha.

**POZOR: Pripravka Reldan 22 EC in Pynex M 22 imata isto aktivno snov – klorpirifos metil. Na istem zemljišču se lahko to aktivno snov uporabi le enkrat v rastni dobi.**



## Priloga 1: Karta razmejenih območij zlate trsne rumenice z žarišči okužbe in varovalnimi pasovi ter seznam občin v razmejenih območjih



Karta razmejenih območij zlate trsne rumenice z žarišči okužbe in varovalnimi pasovi na dan 5. 7. 2018

### Seznam občin v razmejenih območjih

#### Primorska

- občine: Piran, Vipava, Šempeter-Vrtojba, Sežana, Brda, Renče-Vogrsko, Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, Kanal, Komen, Hrpelje-Kozina, Ajdovščina, Izola, Koper, Ankaran, Divača.

#### Dolenjska, Posavje in Bela Krajina

- občine: Brežice, Črnomelj, Dolenjske toplice, Ivančna Gorica, Kostanjevica na Krki, Krško, Litija, Metlika, Mirna peč, Mirna, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, Radeče, Semič, Sevnica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke toplice, Šmartno pri Litiji, Trebnje, Žužemberk.

#### Štajerska in Prekmurje:

- občine: Apače, Beltinci, Benedikt, Bistrica ob Sotli, Braslovče, Cankova, Celje, Cerkljenjak, Cirkulane, Črenšovci, Destričnik, Dobje, Dobrna, Dobrovnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hajdina, Hoče-Slivnica, Hodoš, Juršinci, Kidričevo, Kobilje, Kozje, Križevci, Kungota, Kuzma, Laško, Lenart, Lendava, Ljutomer, Majšperk, Makole, Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Moravske Toplice, Mozirje, Murska Sobota, Odranci, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podčetrtek, Podlehnik, Poljčane, Polzela, Prebold, Ptuj, Puconci, Rače-Fram, Radenci, Razkrižje, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Središče ob Dravi, Starše, Sv. Trojica v Slovenskih goricah, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentilj, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Tišina, Trnovska vas, Turnišče, Velenje, Velika Polana, Veržej, Videm, Vojnik, Vranksko, Zavrč, Zreče, Žalec, Žetale.

## Priloga 2: Institucije, v katerih deluje Javna služba zdravstvenega varstva rastlin

| Varstvo rastlin v vinogradništvu, sadjarstvu, hmeljarstvu, oljkarstvu, poljedelstvu, vrtnarstvu |   |
|---|---|
| Območje napovedi  | Institucija   |
| Osrednja Slovenija<br>splošne in napovedi za vso Slovenijo                                      | Kmetijski inštitut Slovenije<br>Hacquetova 17, 1000 Ljubljana<br>Tel.: 01 28 05 262<br>Faks: 01 28 05 255<br>Tel. odzivnik: (01) 28 05 266<br>e-pošta: <a href="mailto:info@kis.si">info@kis.si</a><br>spletna stran: <a href="http://www.kis.si">http://www.kis.si</a>   |
| Severovzhodna Slovenija   | Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor<br>Vinarska ulica 14, 2000 Maribor<br>Tel.: 02 228 49 00<br>Faks: 02 251 94 82<br>Tel. odzivnik: 090 93 98 12<br>e-pošta: <a href="mailto:info@kmetijski-zavod.si">info@kmetijski-zavod.si</a><br>spletna stran: <a href="http://www.kmetijski-zavod.si/">http://www.kmetijski-zavod.si/</a>                |
| Celjska in Koroška regija   | Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije<br>Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec<br>Tel.: 03 712 16 00<br>Faks: 03 712 16 20<br>Tel. odzivnik: (03) 712 16 60<br>e-pošta: <a href="mailto:tajnistvo@ihps.si">tajnistvo@ihps.si</a><br>spletna stran: <a href="http://www.ihps.si">http://www.ihps.si</a>   |
| Zahodna Slovenija   | Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica<br>Pri Hrastu 18, 5000 Nova Gorica<br>Tel.: 05 33 51 200<br>Faks: 05 33 51 260<br>Tel. odzivnik: 090 93 98 15<br>e-pošta: <a href="mailto:entolab@go.kgzs.si">entolab@go.kgzs.si</a><br>spletna stran: <a href="http://www.kmetijskizavod-ng.si">www.kmetijskizavod-ng.si</a>                           |
| Jugovzhodna Slovenija   | Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto<br>Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto<br>Tel.: 07 373 05 70<br>Faks: 07 373 05 90<br>Tel. odzivnik: 090 93 98 17<br>e-pošta: <a href="mailto:tajnistvo@kgzs-zavodnm.si">tajnistvo@kgzs-zavodnm.si</a><br>spletna stran: <a href="http://www.kmetijskizavod-nm.si/">http://www.kmetijskizavod-nm.si/</a> |

## KAM PO INFORMACIJE

### MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Dunajska 22  
1000 Ljubljana  
Telefon: (01) 478 90 00  
E-pošta: [gp.mkgp@gov.si](mailto:gp.mkgp@gov.si)  
Splet: <http://www.mkgp.gov.si/>

### UPRAVA RS ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN

Dunajska 22  
1000 Ljubljana  
Telefon: (01) 300 13 00  
E-pošta: [gp.uvhvvr@gov.si](mailto:gp.uvhvvr@gov.si)  
Splet: <http://www.uvhvvr.gov.si/>

### KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

#### Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana  
Telefon: (01) 513 66 00  
Telefax: (01) 513 66 50  
E-pošta: [kgzs@kgzs.si](mailto:kgzs@kgzs.si)  
Splet: [www.kgzs.si](http://www.kgzs.si)

| Lokacija             | Telefon                        |
|----------------------|--------------------------------|
| <b>KGZ CELJE</b>     |                                |
| Celje                | (03) 490 75 80                 |
| Dravograd            | (02) 871 06 80                 |
| Laško                | (03) 734 08 71                 |
| Mozirje              | (03) 839 09 10                 |
| Prevalje             | (02) 824 69 20                 |
| Slovenj Gradec       | (02) 883 99 10                 |
| Slovenske Konjice    | (03) 759 18 50                 |
| Šentjur              | (03) 749 10 62                 |
| Šmarje pri Jelšah    | (03) 818 30 42                 |
| Šoštanj              | (03) 898 82 70                 |
| Žalec                | (03) 710 17 80                 |
| <b>KGZ KRANJ</b>     |                                |
| Bled                 | (04) 535 36 28                 |
| Bohinj               | (04) 574 66 14                 |
| Cerklje              | (04) 252 67 10                 |
| Jesenice             | (04) 586 92 50                 |
| Križe                | (04) 595 58 00                 |
| Lesce                | (04) 535 36 18                 |
| Naklo                | (04) 257 65 10                 |
| Primskovo            | (04) 234 24 10                 |
| Škofja Loka          | (04) 511 27 02                 |
| Žiri                 | (04) 505 03 27                 |
| <b>KGZ LJUBLJANA</b> |                                |
| Cerknica             | (01) 709 70 40, (01) 709 70 41 |
| Dobrepolje           | (01) 786 71 50                 |

| Lokacija                 | Telefon                        |
|--------------------------|--------------------------------|
| Dobrova                  | (01) 366 31 92                 |
| Ljubljana – Dobrunje     | (01) 542 97 72                 |
| Domžale                  | (01) 724 48 55                 |
| Grosuplje                | (01) 787 25 94                 |
| Ig                       | (01) 290 94 62                 |
| Ivančna Gorica           | (01) 786 93 10                 |
| Kamnik                   | (01) 839 77 69                 |
| Kočevje                  | (01) 895 38 76                 |
| Litija                   | (01) 899 50 14                 |
| Ljubljana                | (01) 513 07 16                 |
| Logatec                  | (01) 754 29 33                 |
| Loški Potok              | (01) 835 01 20                 |
| Medvode                  | (01) 361 82 86                 |
| Ribnica                  | (01) 836 19 27                 |
| Ljubljana – Tomačevo     | (01) 561 26 70                 |
| Velike Lašče             | (01) 788 88 42                 |
| Vrhnika                  | (01) 750 20 08                 |
| Zagorje                  | (03) 567 93 90, (03) 567 93 91 |
| <b>KGZ MARIBOR</b>       |                                |
| Jakobski Dol             | (02) 640 10 35                 |
| Maribor                  | (02) 228 49 49, (02) 228 49 48 |
| <b>KGZ MURSKA SOBOTA</b> |                                |
| Cankova                  | (02) 540 13 51                 |
| Beltinci                 | (02) 570 14 40                 |
| Gornja Radgona           | (02) 562 17 00                 |
| Gornji Petrovci          | (02) 556 91 15                 |
| Križevci pri Ljutomeru   | (02) 588 81 44                 |
| Lendava                  | (02) 575 19 35                 |
| Murska Sobota            | (02) 539 14 21                 |
| Prosenjakovci            | (02) 544 90 52                 |
| <b>KGZ NOVA GORICA</b>   |                                |
| Ajdovščina               | (05) 367 10 70                 |
| Bilje                    | (05) 395 42 63                 |
| Brda                     | (05) 395 95 30                 |
| Idrija                   | (05) 377 22 54                 |
| Ilirska Bistrica         | (05) 710 02 60                 |
| Koper                    | (05) 630 40 62                 |
| Nova Gorica              | (05) 335 12 08                 |
| Pivka                    | (05) 757 01 40                 |
| Postojna                 | (05) 720 04 30                 |
| Sežana                   | (05) 731 28 50                 |
| Tolmin                   | (05) 388 42 84                 |
| <b>KGZ NOVO MESTO</b>    |                                |
| Brežice                  | (07) 496 11 65                 |
| Črnomelj                 | (07) 305 62 10                 |
| Krško                    | (07) 490 22 10                 |
| Metlika                  | (07) 363 60 60                 |
| Novo mesto               | (07) 332 19 42                 |
| Sevnica                  | (07) 814 17 25                 |
| Trebnje                  | (07) 346 06 70                 |
| <b>KGZ PTUJ</b>          |                                |
| Lenart                   | (02) 729 09 41                 |
| Ormož                    | (02) 741 75 00                 |

| Lokacija           | Telefon        |
|--------------------|----------------|
| Ptuj               | (02) 749 36 31 |
| Radlje ob Dravi    | (02) 877 06 91 |
| Slovenska Bistrica | (02) 843 01 32 |
| Sveta Ana          | (02) 729 09 47 |

## KORISTNE POVEZAVE

Zlata trsna rumenica

[http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna\\_podrocja/zdravje\\_rastlin/nevarni\\_skodljivci\\_in\\_bolezni\\_rastlin/karantenski\\_skodljivi\\_organizmi/posebno\\_nadzorovani\\_skodljivi\\_organizmi/zlata\\_trsna\\_rumenica/](http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/nevarni_skodljivci_in_bolezni_rastlin/karantenski_skodljivi_organizmi/posebno_nadzorovani_skodljivi_organizmi/zlata_trsna_rumenica/)

Agrometeorološki portal Slovenije (<http://agromet.mkgp.gov.si/PP>)

Javna služba zdravstvenega varstva rastlin

[http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna\\_podrocja/zdravje\\_rastlin/sluzba\\_za\\_varstvo\\_rastlin/](http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/sluzba_za_varstvo_rastlin/)

Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin – FITO-INFO (<http://www.fito-info.si/>)

Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice

(<http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11908>)

Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (<http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7211>)

Slikovno gradivo

[http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna\\_podrocja/zdravje\\_rastlin/rastlinski\\_skodljivi\\_organizmi/karantenski\\_skodljivi\\_organizmi/posebno\\_nadzorovani\\_organizmi/zlata\\_trsna\\_rumenica/slikovno\\_gradivo/](http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/rastlinski_skodljivi_organizmi/karantenski_skodljivi_organizmi/posebno_nadzorovani_organizmi/zlata_trsna_rumenica/slikovno_gradivo/)







## ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA

KI JE PRENAŠALEC FITOPLAZME, POVZROČITELJICE ZLATE TRSNE RUMENICE (FITOPLAZMA *Grapevine flavescence dorée*), ZA POTREBE IZVAJANJA IZBIRNE ZAHTEVE »VIN\_INSK: OPUSTITEV UPORABE INSEKTICIDOV« ZNOTRAJ OPERACIJE VINOGRADNIŠTVO V OKVIRU UKREPA KMETUSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014-2020

